独立行政法人国立病院機構東名古屋病院　検査基準値　一覧

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
TP	総蛋白	TP			6.7	8.3	g/dl
ALB	ｱﾙﾌﾞﾐﾝ	ALB			4.0	5.0	g/dl
*A/G	A/G	*A/G			1.50	2.00	比
T-BIL	総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ	T-BIL			0.30	1.20	mg/dl
直接ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ	直接ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ	D-Bil			0.0	0.4	mg/dl
間接ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ	間接ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ	間-Bil			0.0	0.8	mg/dl
ALP	ｱﾙｶﾘﾌｫｽﾌｧﾀｰｾﾞ	ALP			115	359	U/l
CHE	ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ	CHE			214	466	U/l
LAP	LAP	LAP			30	70	U/l
AST	AST (GOT)	AST			13	33	U/l
ALT	ALT (GPT)	ALT			5	45	U/l
γGTP	γ-GTP	γGTP			10	47	U/l
LD	LD (LDH)	LD			119	229	U/l
CK	CK	CK		男	62	287	U/l
				女	45	163	U/l
AMY	ｱﾐﾗｰｾﾞ	AMY			37	125	U/l
S-GLU	血清ｸﾞﾙｺｰｽ	S-GLU			69	104	mg/dl
UA	尿酸	UA		男	3.6	7.0	mg/dl
				女	2.3	7.0	mg/dl
UN	尿素窒素	UN			8	22	mg/dl
CRE	ｸﾚｱﾁﾆﾝ	CRE		男	0.60	1.10	mg/dl
				女	0.40	0.70	mg/dl
T-CHO	総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	T-CHO			128	219	mg/dl
TG	ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ (TG)	TG			30	149	mg/dl
HDL	HDL-ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	HDL			40	96	mg/dl
LDL	LDL-ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	LDL			70	139	mg/dl
Ca	ｶﾙｼｳﾑ	Ca			8.7	10.3	mg/dl
IP	無機ﾘﾝ	IP			2.5	4.7	mg/dl
Fe	血清鉄	Fe		男	54	181	μg/dl
				女	43	172	μg/dl
UIBC	不飽和鉄結合能	UIBC		男	104	259	μg/dl
				女	108	325	μg/dl
ﾌｪﾘﾁﾝ	ﾌｪﾘﾁﾝ	ﾌｪﾘﾁﾝ		男	39.4	340	ng/ml
				女	3.6	114	ng/ml
NA	ﾅﾄﾘｳﾑ	NA			138	146	mmol/l
CL	ｸﾛｰﾙ	CL			99	109	mmol/l
K	ｶﾘｳﾑ	K			3.6	4.9	mmol/l
CRP	CRP	CRP				0.30	mg/dl
高感度CRP	高感度ＣＲＰ	高感CRP				0.100	mg/dl
ZTT	ZTT	ZTT			1	13	K-U
ｱﾝﾓﾆｱ	血中ｱﾝﾓﾆｱ	ｱﾝﾓﾆｱ			12	66	μg/dl
BNP	BNP	BNP				18.4	pg/ml
NT-proBNP	NT-proBNP	NT-proBN				125	pg/ml
血糖	血糖	血糖			80	112	mg/dl
HbA1c (JDS)	HbA1c (JDS値)	A1c (JDS)			4.3	5.8	%
HbA1c (NGSP)	HbA1c (NGSP値)	A1c (NGSP			4.6	6.2	%
ｼｽﾀﾁﾝC	ｼｽﾀﾁﾝC	ｼｽﾀﾁﾝC			0.59	1.03	mg/l
ｸﾚｱﾁﾆﾝｸﾘｱﾗﾝｽ	ｸﾚｱﾁﾆﾝｸﾘｱﾗﾝｽ	CCr		男	78	151	l/day
				女	73	150	l/day
RF	RF	RF				15	IU/mL
MMP-3	MMP-3	MMP-3		男	37	121	ng/ml
				女	17	60	ng/ml
IgG	IgG	IgG			870	1700	mg/dl
IgA	IgA	IgA			110	410	mg/dl
IgM	IgM	IgM		男	33	190	mg/dl
				女	46	260	mg/dl
IgE	IgE	IgE				200	U/ml
C3	補体 C3	C3			65	135	mg/dl
C4	補体 C4	C4			13.0	35.0	mg/dl
CH50	補体価 CH50	CH50			30	50	U/ml
1h	赤沈1Hr	1h		男	2	10	mm
				女	3	15	mm
RPR (定量)	梅毒 RPR (定量)	RPR (定量			-10.00	1.00	
TP (梅毒)	TP (梅毒)	TP (梅毒)			0.00	0.99	S/CO
TP (TU値)	TP (TU値)	TP (TU値)			0.00	10.00	unit

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
HBsAg	HBs抗原	HBsAg			0.00	0.04	IU/ml
HBsAb	HBs抗体	HBsAb			0.0	10.0	mIU/ml
HCVAb	HCV抗体	HCVAb			0.00	0.99	S/CO
HIV-AgAb	HIV抗原/抗体	HIV-AgAb			0.00	0.99	S/CO
寒冷凝集反応	寒冷凝集反応	寒冷凝集			(－)	×32	倍
ASP-Agｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ASP-Agｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ				0.5	
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ				0.9	
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ			0	0.5	S/CO
β-Dｸﾞﾙｶﾝ	β-Dｸﾞﾙｶﾝ	β-Dｸﾞﾙ			0.0	11.0	pg/ml
CD4%	CD4 %	CD4%			25.0	54.0	%
CD8%	CD8 %	CD8			23.0	56.0	%
CD4/8比	CD4/8 比	CD4/8比			0.40	2.30	
MAC抗体	MAC抗体	MAC抗体				0.70	U/mL
TSH	TSH	TSH			0.35	4.94	μU/ml
FT3	FT3	FT3			1.71	3.71	pg/ml
FT4	FT4	FT4			0.70	1.48	ng/dl
CEA	CEA	CEA				5.0	ng/ml
AFP	AFP	AFP				10.0	ng/ml
CA19-9	CA19-9	CA19-9			0.0	37.0	U/ml
ｼﾌﾗ	ｼﾌﾗ	ｼﾌﾗ			0.0	3.5	ng/ml
SCC	SCC	SCC				2.0	ng/ml
ProGRP	ProGRP	ProGRP				81	pg/mL
SLX	ｼﾘｱﾙLe×-i抗原	SLX				38	U/ml
KL-6	KL-6	KL-6				500	U/ml
RBC	赤血球数x10^4	RBC		男	430	570	x10^4/ul
				女	370	490	x10^4/ul
WBC	白血球数x10^2	WBC			35	85	x10^2/ul
Hb	ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	Hb		男	13.5	17.0	g/dl
				女	11.5	15.0	g/dl
Ht	ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	Ht		男	40.0	50.0	%
				女	35.0	45.0	%
Plt	血小板数x10^4	Plt			15.0	35.0	x10^4/ul
MCV	MCV	MCV			85.0	102.0	fl
MCH	MCH	MCH			26.0	34.0	pg
MCHC	MCHC	MCHC			30.0	35.0	%
好中球	好中球率	好中球			42.0	74.0	%
ﾘﾝﾊﾟ球	ﾘﾝﾊﾟ球率	ﾘﾝﾊﾟ球			18.0	48.0	%
単球	単球率	単球			3.0	7.0	%
好酸球	好酸球率	好酸球			1.0	6.0	%
好塩基球	好塩基球率	好塩基球			0.0	1.0	%
ﾚﾁｸﾛ	網状赤血球	ﾚﾁｸﾛ			1	10	‰
NSTｱﾙﾌﾞﾐﾝ	血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ(NST)	NSTｱﾙﾌﾞﾐ				3.0	g/dl
TT(%)	ﾄﾛﾝﾎﾞﾃｽﾄ(TT)	TT(%)			80.0	120.0	%
HPT	ﾍﾊﾟﾌﾟﾗｽﾁﾝﾃｽﾄ	HPT			70.0	130.0	%
PT	ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝﾃｽﾄ(PT)	PT			10.0	13.0	秒
PT(%)	PT(%)	PT(%)			70.0	140.0	%
PT・INR	PT(INR)	PT・INR			0.90	1.10	
APTT	活性部分ﾄﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗｽﾁﾝ	APTT			25	40	秒
ﾌｨﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ	ﾌｨﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ	ﾌｨﾌﾞﾘﾉｰｹ			150	400	mg/dl
AT-III	ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝIII	AT-III			80	120	%
FDP	FDP	FDP			0	5	μg/ml
Dﾀﾞｲﾏｰ	Dﾀﾞｲﾏｰ	Dﾀﾞｲﾏｰ				1.00	μg/ml
TAT	ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ･ATIII複合体	TAT				3	ng/ml
出血時間	出血時間	出血時間			0	5	分
_陽性率	ALP染色陽性率	_陽性率			60.5	99.5	%
_SCORE	NAPｽｺｱｰ	_SCORE			170	335	
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸			50.0	100.0	μg/ml
PH	PH	PH			4.8	7.5	
糖定性	糖定性	糖定性				(－)	
糖半定量	糖半定量	糖半定量				50	mg/dl
蛋白定性	蛋白定性	蛋白定性				(－)	
蛋白半定量	蛋白半定量	蛋白半定				15	mg/dl
潜血	潜血	潜血				(－)	
ｹﾄﾝ体	ｹﾄﾝ体	ｹﾄﾝ体				(－)	
ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ定性	ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ定性	ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ				(－)	
ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ	ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ	ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹ				正常	

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
比重	比重	比重			1.008	1.034	
PH	PH	PH			4.8	7.5	
比重	比重	比重			1.008	1.034	
糖定量	部分尿糖定量	糖定量				0.02	g/dl
蛋白定量	部分尿蛋白定量	蛋白定量				10	mg/dl
尿ｱﾐﾗｰｾﾞ	尿ｱﾐﾗｰｾﾞ	尿ｱﾐﾗｰｾﾞ			30	950	U/l
糖排出量	糖排出量(1日)	糖排出量			0.04	0.09	g/day
Na排泄量	Na排泄量(1日)	Na排泄量			70	252	mEq/day
K排泄量	K排泄量(1日)	K排泄量			26	100	mEq/day
Cl排泄量	Cl排泄量(1日)	Cl排泄量			70	251	mEq/day
U-UA (24h)	尿UA(24h蓄尿)	U-UA (24			0.4	1.2	g/day
U-UN (24h)	尿UN(24h蓄尿)	U-UN (24			6.5	13.0	g/day
U-CRE(24h)	尿CRE(24h蓄尿)	U-CRE(24		男	0.70	2.20	g/day
				女	0.40	1.50	g/day
糖半定量	糖半定量	糖半定量				50	mg/dl
蛋白半定量	蛋白半定量	蛋白半定				15	mg/dl
PH	PH	PH			7.4	7.6	
細胞数	細胞数	細胞数			0	5	/mm3
総蛋白	総蛋白	総蛋白			3	40	mg/dl
糖定量	糖定量	糖定量			50	75	mg/dl
EIA価(髄)	EIA価(髄)	EIA価(髄			0		
EIA価(髄)	EIA価(髄)	EIA価(髄			0		
抗体指数(髄)	抗体指数(髄)	抗体(髄)				1	
EIA価(髄)	EIA価(髄)	EIA価(髄				0.2	
VCA-IgG(髄液	VCA抗体-IgG(髄液)	VCA-IgG(				1	倍
VCA-IgM(髄液	VCA抗体-IgM(髄液)	VCA-IgM(				1	倍
EA-IgG(髄液)	EA抗体-IgG(髄液)	EA-IgG髄				1	倍
EBNA抗体(髄	EBNA抗体(髄液)	EBNA抗体				1	倍
VMA(血漿)	VMA(血漿)	VMA(血漿			4.3	12.1	ng/ml
HVA(血漿)	HVA(血漿)	HVA(P)			7.0	25.0	ng/mL
総蛋白	総蛋白	総蛋白			0.0	4.0	g/dl
穿刺液TP	穿刺液 TP	穿TP			0.0	4.0	g/dl
有核細胞	有核細胞	有核細胞			5.0	20.0	10^4/μl
巨核球数	巨核球数	巨核球数			50	150	/μl
ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ	ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ	ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞ			15.0	40.0	μg/ml
ﾌｪﾆﾄｲﾝ	ﾌｪﾆﾄｲﾝ	ﾌｪﾆﾄｲﾝ			10.0	20.0	μg/ml
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ	ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ	ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋ			4.0	10.0	μg/ml
ｼﾞｺﾞｷｼﾝ	ｼﾞｺﾞｷｼﾝ	ｼﾞｺﾞｷｼﾝ			0.4	2.0	ng/ml
ﾃｵﾌｨﾘﾝ	ﾃｵﾌｨﾘﾝ	ﾃｵﾌｨﾘﾝ			10.0	20.0	μg/ml
ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ	ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ	ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ			5.0	12.0	μg/ml
ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ	ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ	ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ			3	17	ng/ml
ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ	ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ	ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄ			2	5	μg/ml
ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ	ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ	ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ			10.0	70.0	ng/ml
ﾀｸﾛﾘﾑｽ	ﾀｸﾛﾘﾑｽ	ﾀｸﾛﾘﾑｽ			5.0	20.0	ng/ml
ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ	ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ	ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ			600.0	1000.0	ng/ml
ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ	ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ	ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ			10.0	30.0	μg/ml
ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ	ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ	ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ			10.0	30.0	μg/ml
A/G比	A/G比	A/G比			1.36	2.26	
ｱﾙﾌﾞﾐﾝ	ｱﾙﾌﾞﾐﾝ	ｱﾙﾌﾞﾐﾝ			57.5	69.2	%
α1	α1	α1			2.0	3.3	%
α2	α2	α2			5.9	9.7	%
β	β	β			8.0	12.2	%
γ	γ	γ			11.1	22.0	%
抗核抗体	抗核抗体(ANA)	抗核抗体				40	倍
ｲﾝｽﾘﾝ前	ｲﾝｽﾘﾝ前	ｲﾝｽﾘﾝ前			1.84	12.20	μIU/mL
ｲﾝｽﾘﾝ朝食前	ｲﾝｽﾘﾝ朝食前	ｲﾝｽﾘ朝前			2.20	12.40	μIU/mL
PSA	PSA	PSA				4.0	ng/mL
高感度PSA	高感度PSA	H-PSA				4.000	ng/mL
高感度PSAF/T	高感度PSA F/T比	H-PSAF/T			26		%
CKMB(阻害)	CK-MB (阻害)	CKMB(阻)				25	U/L
CA15-3	CA15-3	CA15-3			0.0	31.3	U/mL
抗SS-A/Ro抗	抗SS-A/Ro抗体	抗SS-A/R				1	倍
抗SS-B/La抗	抗SS-B/La抗体	抗SS-B/L				1	倍
INDEX	INDEX	INDEX				15.0	
抗DNA抗体	抗DNA抗体(RIA)	抗DNA抗			0	6	IU/ml
抗ds-DNAIgG	抗ds-DNA抗体IgG	抗dsDNAG				12	IU/ml

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
抗Jo-1抗体	抗Jo-1抗体(ｵｸﾀﾛｰﾆ法)	抗Jo-1抗				1	倍
抗ss-DNAIgG	抗ss-DNA抗体IgG	抗ssDNAG				25	AU/ml
抗Sm抗体	抗Sm抗体	抗Sm抗体				1	倍
ﾋｱﾙﾛﾝ酸	ﾋｱﾙﾛﾝ酸	ﾋｱﾙﾛﾝ酸				50	ng/ml
CA15-3	CA15-3	CA15-3			0	27	U/ml
抗TPO抗体	抗TPO抗体	抗TPO抗				16	IU/ml
ｱﾙﾄﾞﾗｰｾﾞ	ｱﾙﾄﾞﾗｰｾﾞ	ｱﾙﾄﾞﾗｰｾﾞ			1.2	7.5	IU/l
抗ｱｾﾁﾙｺﾘﾝR	抗ｱｾﾁﾙｺﾘﾝﾚｾﾌﾟﾀｰ抗体	抗ｱｾﾁﾙｺﾘ				0.2	nmol/l
ﾙｰﾌﾟｽｱﾝﾁｺｱｸﾞ	ﾙｰﾌﾟｽｱﾝﾁｺｱｸﾞﾗﾝﾄ蛇毒	ﾙｰﾌﾟｽｱﾝﾁ				1.3	
ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ(CF	ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏﾆｭｰﾓﾆｴ(CF)	ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞ				4	倍
×PSA(CLEIA)	PSA(CLEIA)	PSA(CLEI				4.00	ng/ml
ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ	ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ定量	ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ				1	pg/ml
RAPA	ﾘｳﾏﾁ因子(RAPA)　(未)	RAPA				40	倍
ｲﾝｽﾘﾝ抗体	ｲﾝｽﾘﾝ抗体	ｲﾝｽﾘﾝ抗			0	0.4	無し
IRI抗体結合HKK	IRI抗体結合	IRI結合			0	0.4	%
IRI抗体濃度HKK	IRI抗体濃度	IRI濃度			0	125	nU/ml
1.5AG	1.5AG	1.5AG			12	16	ng/ml
1.5AG (L用)	1.5AG(LSI用)	1.5AG			14	999	ng/ml
×高感度PSA	高感度PSAタンデム	高感PSA				4.000	ng/mL
×高PSA　F/T比	高感度PSA　F/T比	高PSF/T				25	%
ｶﾝｼﾞﾀﾞﾏﾝﾅﾝAg	ｶﾝｼﾞﾀﾞﾏﾝﾅﾝAg	ｶﾝｼﾞﾀﾞﾏﾝ				0.05	U/ml
γｰｾﾐﾉﾌﾟﾛﾃｲﾝ	γｰｾﾐﾉﾌﾟﾛﾃｲﾝ(γ-Sm)	γｰｾﾐﾉﾌﾟ			0	4.0	ng/ml
未) G-CSF	G-CSF(顆粒球ｺﾛﾆｰ刺激	G-CSF(				39	pg/ml
抗CCP抗体	抗ｼﾄﾙﾘﾝ化ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ抗体	抗CCP抗				4.5	U/ml
未)抗平滑筋抗体	抗平滑筋抗体(研究費)	抗平滑筋				40	倍
抗GBM抗体	抗GBM抗体	抗GBM抗				3.0	EU
東浜株	東浜株	東浜株				10	倍
山口株	山口株	山口株				10	倍
ﾃﾞｵｷｼﾋﾟ(DPD)	ﾃﾞｵｷｼﾋﾟﾘｼﾞﾉﾘﾝ(DPD)	ﾃﾞｵｷｼﾋﾟ(		男	2.1	5.4	nM/L
				女	2.8	7.6	nM/L
×P-ANCA(MPO)	×P-ANCA(MPO-ANCA)未使用	P-ANCA(M				3.5	EU
×C-ANCA(PR3)	×C-ANCA(PR3-ANCA)	C-ANCA(P				3.5	EU
×抗Scl-70抗体	×抗Scl-70抗体	×Scl-70			0	16	
×ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	xｲﾝﾃﾞｯｸｽ	xｲﾝﾃﾞｯｸ			0	16.0	
抗BP180抗体	抗BP180NC16a抗体	抗BP180				9	
抗Dsg1抗体	抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ 1抗体	抗Dsg1				14.0	
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ				14	
抗Dsg3抗体	抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ 3抗体	抗Dsg3				7	
TSAb(刺激性	TSH刺激性ﾚｾﾌﾟﾀｰ抗体	TSAb(刺			0	120	%
TSAb_EIA値	TSH刺激性ﾚｾﾌﾟﾀｰ抗体	TSAb_EIA			0	120	%
結合阻害率	結合阻害率	結合阻害			-10	15.0	%
抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ抗	抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ抗体(AMA)	抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞ				20	倍
抗ﾐﾄｺﾝM2抗体	抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱM2抗体	抗ﾐﾄｺﾝM2				7	
HGF	HGF(肝細胞増殖因子)	HGF				0.4	ng/ml
ｻｲﾛｲﾄﾞﾃｽﾄ	ｻｲﾛｲﾄﾞﾃｽﾄ	ｻｲﾛｲﾄﾞﾃｽ				100	倍
ﾏｲｸﾛｿﾞｰﾑﾃｽﾄ	ﾏｲｸﾛｿﾞｰﾑﾃｽﾄ	ﾏｲｸﾛｿﾞｰﾑ				100	倍
ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝIgG	抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝ抗体IgG	ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟ				10	U/ml
IC(C1q)	免疫複合体(C1q)	IC(C1q)				3	μg/ml
α1ｱﾝﾁﾄﾘﾌﾟｼﾝ	α1ｱﾝﾁﾄﾘﾌﾟｼﾝ	α1ｱﾝﾁﾄﾘ			94	150	mg/dl
DUPAN-2	DUPAN-2	DUPAN-2				150	U/ml
ﾌﾟﾚｱﾙﾌﾞﾐﾝ	ﾌﾟﾚｱﾙﾌﾞﾐﾝ	ﾌﾟﾚｱﾙﾌﾞﾐ			22.0	40.0	mg/dl
抗LKM-1抗体	抗LKM-1抗体	抗LKM-1				17	Index
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ				17	
ASO	ASO(抗ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾘｼﾞﾝO-Ab	ASO				240	IU/ml
β2-MG(血)	β2-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ(血)	β2(血)			0.9	1.9	mg/l
β2-MG(尿)	β2-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ(尿)	β2(尿)			0	200	μg/l
β2-MG(蓄尿)	β2-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ(蓄尿	β2(蓄尿			0	230	μg/l
α1-MG(尿)	α1-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ(尿)	α1(尿)		男	0.6	16.6	mg/L
				女	0.5	9.75	mg/L
ﾚﾁﾉｰﾙ結合蛋	ﾚﾁﾉｰﾙ結合蛋白(RBP)	ﾚﾁﾉｰﾙ結			2.5	7.1	mg/dl
ﾚﾁﾉｰﾙ(RBP)	ﾚﾁﾉｰﾙ結合蛋白(RBP)BML	ﾚﾁﾉｰﾙ結			2.5	7.1	mg/dl
抗CL-β2GP1	抗CL-β2GP1	抗CL-β2				3.5	U/ml
未)ｾﾛﾄﾆﾝ	血中セロトニン	ｾﾛﾄﾆﾝ			57	230	ng/ml
総ﾎﾓｼｽﾃｲﾝ	総ﾎﾓｼｽﾃｲﾝ	総ﾎﾓｼｽﾃｲ			3.7	13.5	nmol/ml
ｱﾎﾟ蛋白 A-Ⅰ	ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 A-Ⅰ	ｱﾎﾟA-Ⅰ		男	119	155	mg/dl
				女	126	165	mg/dl

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
ｱﾎﾟ蛋白 A-Ⅱ	ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 A-Ⅱ	ｱﾎﾟA-Ⅱ		男	25.9	35.7	mg/dl
				女	24.6	33.3	mg/dl
ｱﾎﾟ蛋白 B	ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 B	ｱﾎﾟ B		男	73	109	mg/dl
				女	66	101	mg/dl
ｱﾎﾟ蛋白 C-Ⅱ	ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 C-Ⅱ	ｱﾎﾟ C-Ⅰ		男	1.8	4.6	mg/dl
				女	1.5	3.8	mg/dl
ｱﾎﾟ蛋白 C-Ⅲ	ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 C-Ⅲ	ｱﾎﾟ C-Ⅱ		男	5.8	10.0	mg/dl
				女	5.4	9.0	mg/dl
ｱﾎﾟ蛋白 E	ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 E	ｱﾎﾟ E		男	2.7	4.3	mg/dl
				女	2.8	4.6	mg/dl
RLPｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	RLPｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	RLPｺﾚｽﾃﾛ				7.5	mg/dl
PA-IgG	PA-IgG(血小板関連IgG	PA-IgG				46	
DHEA-S	DHEA-S	DHEA-S	41～50歳	男	70	495	μg/dl
			51～60歳		38	313	μg/dl
			61～70歳		24	244	μg/dl
			71歳以上		5	253	μg/dl
			41～50歳	女	19	231	μg/dl
			51～60歳		8	188	μg/dl
			61～70歳		12	133	μg/dl
			71歳以上		7	177	μg/dl
NSE	NSE(RIA)	NSE				16.3	ng/ml
ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ_SRL	ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ(ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ)	ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ				100	pg/ml
ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅ_SRL	ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ(ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ)	ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘ			140	450	pg/ml
ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ_SRL	ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ	ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ				20	pg/ml
_ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ_LSI	ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ(ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ)	ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ			0	0.17	ng/mL
_ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅ_LSI	ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ	ﾉﾙｱﾄﾞ			0.15	0.57	ng/mL
_ﾄﾞｰﾊﾟﾐ_LSI	ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ	ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ			0	0.03	ng/mL
ﾋﾞﾀﾐﾝB12	ﾋﾞﾀﾐﾝB12	ﾋﾞﾀﾐﾝB12			180	914	pg/ml
葉酸	葉酸	葉酸			4.0	99999999	ng/ml
ACE	ACE	ACE			7.7	29.4	U/L
CA125	CA125	CA125				35	U/ml
MM	MM	MM			92.4	100.0	%
MB	MB	MB			0.0	6.6	%
BB	BB	BB			0.0	1.9	%
CK-MB(CLIA)	CK-MB(CLIA)	CK-MB(CL			0.9	5.9	ng/ml
ｴﾗｽﾀｰｾﾞ1	ｴﾗｽﾀｰｾﾞ1	ｴﾗｽﾀｰｾﾞ1				300	ng/dl
ﾄﾘﾌﾟｼﾝ	ﾄﾘﾌﾟｼﾝ(RIA)	ﾄﾘﾌﾟｼﾝ			100.0	550.0	ng/ml
ﾋﾞﾀﾐﾝB2	ﾋﾞﾀﾐﾝB2	ﾋﾞﾀﾐﾝB2			66.1	111.4	ng/ml
ﾋﾞﾀﾐﾝB2(BML)	ﾋﾞﾀﾐﾝB2(BML)	ﾋﾞﾀﾐﾝB2			4.1	8.8	μg/dL
ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞ				33.7	ng/ml
LDH1	LDH1	LDH1			20.0	31.0	%
LDH2	LDH2	LDH2			28.8	37.0	%
LDH3	LDH3	LDH3			21.5	27.6	%
LDH4	LDH4	LDH4			6.3	12.4	%
LDH5	LDH5	LDH5			5.4	13.2	%
ALP2	ALP2	ALP2			35.8	74.0	%
ALP3	ALP3	ALP3			25.1	59.0	%
ALP5	ALP5	ALP5			0.0	16.1	%
TPA	TPA	TPA				70	U/l
Pｱﾐﾗｰｾﾞ定量	P型ｱﾐﾗｰｾﾞ定量	Pｱﾐﾗｰｾﾞ			14	42	U/l
乳酸	乳酸	乳酸			3.0	17.0	mg/dl
ﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸	ﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸	ﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸			0.3	0.94	mg/dl
ﾊﾞﾘﾝ	ﾊﾞﾘﾝ	ﾊﾞﾘﾝ			156.2	360.4	nmol/ml
ﾒﾁｵﾆﾝ	ﾒﾁｵﾆﾝ	ﾒﾁｵﾆﾝ			15.5	38.6	nmol/ml
ｲｿﾛｲｼﾝ	ｲｿﾛｲｼﾝ	ｲｿﾛｲｼﾝ			37.0	100.4	nmol/ml
ﾛｲｼﾝ	ﾛｲｼﾝ	ﾛｲｼﾝ			74.2	169.1	nmol/ml
ﾁﾛｼﾝ	ﾁﾛｼﾝ	ﾁﾛｼﾝ			38.4	89.4	nmol/ml
ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ	ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ	ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ			43.5	79.8	nmol/ml
ﾘｼﾞﾝ	ﾘｼﾞﾝ	ﾘｼﾞﾝ			125.7	281.9	nmol/ml
ﾋｽﾁｼﾞﾝ	ﾋｽﾁｼﾞﾝ	ﾋｽﾁｼﾞﾝ			63.0	105.2	nmol/ml
ｱﾘｷﾞﾆﾝ	ｱﾘｷﾞﾆﾝ	ｱﾘｷﾞﾆﾝ			31.8	149.5	nmol/ml
ﾌｨｯｼｬｰ比	ﾌｨｯｼｬｰ比	ﾌｨｯｼｬｰ比			2.2	4.3	nmol/ml
T3	T3(ﾄﾘﾖｰﾄﾞｻｲﾛﾆﾝ)	T3			70	176	ng/dl
T4	T4(血清ｻｲﾛｷｼﾝ)	T4			4.8	11.2	μg/dl
ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ	ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ	ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ			6.24	18.0	μg/dl
ICG停滞率	ICG停滞率	停滞率			0.0	10.0	%

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
ICG消失率(K)	ICG消失率	消失率(K			0.168	0.206	
HANP	HANP	HANP				43	pg/ml
ADA	ｱﾃﾞﾉｼﾝﾃﾞｱﾐﾅｰｾﾞ	ADA			7.8	21.1	U/l
SP-D	SP-D	SP-D				110	ng/ml
ﾚﾆﾝ活性(PRA)	ﾚﾆﾝ活性(PRA)00-S用	ﾚﾆﾝ活性			0.3	2.9	ng/ml/hr
ﾚﾆﾝ活性(PRA)	ﾚﾆﾝ活性(PRA)01-B用	ﾚﾆﾝ活性			0.2	3.9	ng/ml/hr
×ADH(未使用)	×ADH(抗利尿ﾎﾙﾓﾝ)	ADH				4.2	pg/ml
ACTH	副腎皮質刺激ﾎﾙﾓﾝ	ACTH			7.2	63.3	pg/ml
PIVKA-II	PIVKA-II(ECLIA)	PIVKA-II				40	mAU/ml
ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ(IRG)	ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ(IRG)	ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ			70	174	pg/ml
抗p53抗体	抗p53抗体	抗p53抗				1.3	U/ml
ｲﾝｽﾘﾝ	ｲﾝｽﾘﾝ	ｲﾝｽﾘﾝ			2.20	12.40	μU/ml
C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ血	C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ血中(CPR)	C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄ			0.61	2.09	ng/ml
C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ尿	C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ蓄尿(CPR)	C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄ			29.2	167.0	μg/day
心室筋ﾐｵｼﾝI	心室筋ﾐｵｼﾝ軽鎖I	心筋ﾐｵI				2.5	ng/ml
ﾋﾞﾀﾐﾝB1	ﾋﾞﾀﾐﾝB1	ﾋﾞﾀﾐﾝB1			24.0	66.0	ng/ml
血中ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ	血中ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ	血中ｱﾙﾄﾞ			36	240	pg/mL
尿中ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ	尿中ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ	尿中ｱﾙﾄﾞ			0	10	μg/day
可溶性IL-2R	可溶性IL-2ﾚｾﾌﾟﾀｰ	可溶性IL			145	519	U/ml
抗GAD抗体	抗GAD抗体	抗GAD抗			0.0	5.0	U/ml
抗IA-2抗体	抗IA-2抗体	抗IA-2抗				0.4	U/ml
Total P	Total P	Total P			15.7	64.0	%
Total S	Total S	Total S			36.0	84.3	%
P/S比	P/S比	P/S比			0.19	1.79	%
ﾄﾗﾝｽﾌｪﾘﾝ	ﾄﾗﾝｽﾌｪﾘﾝ	ﾄﾗﾝｽﾌｪﾘﾝ		男	200	340	mg/dl
				女	200	340	mg/dl
×ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ	×ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ(RIA)	xｴﾘｽﾛﾎﾟｴ			9.1	32.8	mIU/ml
浸透圧(血中)	浸透圧(血中)	浸透(血			275	290	mOsm/kgH2O
浸透圧(尿中)	浸透圧(尿中)	浸透(尿			50	1300	mOsm/kgH2O
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ1	ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ1-HI	ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴ				10	倍
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ2	ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ2-HI	ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴ				10	倍
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ3	ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ3-HI	ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴ				10	倍
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ4	ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ4-HI	ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴ				10	倍
抗体指数	抗体指数	抗体指数				0.8	
ｵｰﾑ病ｸﾗﾐｼﾞｱ	ｵｰﾑ病ｸﾗﾐｼﾞｱ(CF)	ｵｰﾑ病ｸﾗﾐ				4	倍
ｻｲﾄﾒｶﾞﾛIgG	ｻｲﾄﾒｶﾞﾛIgG(EIA)	ｻｲﾄﾒｶﾞﾛI				2	
EIA価	EIA価	EIA価				2	
未)ﾚｼﾞｵﾈﾗ抗体	ﾚｼﾞｵﾈﾗ抗体(重肺ｾｯﾄ)	ﾚｼﾞｵﾈﾗAb			0	256	倍
ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ(PA	ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏﾆｭｰﾓﾆｴ(PA)	ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞ				40	倍
A.ｿﾚﾝ.H1N1	A.ｿﾚﾝ.H1N1	A.ｿﾚﾝ.H1				10	倍
A.ﾎﾝｺﾝ.H3N2	A.ﾎﾝｺﾝ.H3N2	A.ﾎﾝｺﾝ.H				10	倍
B-1	B型	B-1				10	倍
B-2	B-2	B-2				10	倍
IgGindex	IgGindex	IgGindex				0.9	
IgAindex	IgAindex	IgAindex				0.9	
HCV-RNA定量	HCV-RNA定量(RT-PCR)	HCV-RNA			0	1.2	LogIU/ml
EIA価	EIA価	EIA価			0	2.0	
水痘帯状IgM	水痘帯状ﾍﾙﾍﾟｽIgM	水痘IgM			0	0.8	
抗体指数	抗体指数	抗体指数			0	0.8	
IgAindex	IgAindex	IgAindex				0.90	
IgAindex	IgAindex	IgAindex			0	8	EIU
IgGindex	IgGindex	IgGindex				30	
IgGindex	IgGindex	IgGindex			0	30	EIU
EIA価	EIA価	EIA価			0	2	
抗体指数	抗体指数	抗体指数			0	2	
EBV-VCAIgG	EBｳｲﾙｽ EA-VCAIgG	VCAIgG				10	倍
EBV EA-DRIgG	EBｳｲﾙｽEA-DRIgG(EAIgG	EA-DRIgG				10	倍
EBV-VCAIgM	EBｳｲﾙｽ EA-VCAIgM	EBV-VCAI				10	倍
EBV 抗EBNA	EBV 抗EBNA	抗EBNA				10	倍
HCV核酸(分岐	HCV核酸定量(分岐DNA)	HCV(分岐			0.0	0.4	Meq/ml
ｴｺｰｳｲﾙｽ6型	ｴｺｰｳｲﾙｽ6型(NT)	ｴｺｰｳｲﾙｽ6				4	倍
ｴｺｰｳｲﾙｽ11型	ｴｺｰｳｲﾙｽ11型(NT)	ｴｺｰｳｲﾙｽ1				4	倍
ｴｺｰｳｲﾙｽ13型	ｴｺｰｳｲﾙｽ13型(NT)	ｴｺｰｳｲﾙｽ1				4	倍
ｺｸｻｯｷｰA10型	ｺｸｻｯｷｰｳｲﾙｽA群10型	ｺｸｻｯｷｰA1				4	倍
尿素呼気試験	尿素呼気試験(ﾋﾟﾛﾘ菌)	尿素呼気				2.5	
HTLV-1抗体	HTLV-1抗体(ATLV)(PA)	HTLV-1				16	倍

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
S/CO	S/CO	S/CO				1	S/CO
C.O.I.	C.O.I.	C.O.I.			0	1.0	INDX
水痘帯状ﾍﾙﾍﾟ	水痘帯状ﾍﾙﾍﾟｽ(CF)	水痘帯状				4	倍
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽA型(CF)	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ				4	倍
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞB型	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽB型(CF)	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ				4	倍
EIA価	EIA価	EIA価			0	2.0	
抗体指数	抗体指数	抗体指数			0	0.8	
ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ	ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ(CF)	ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ				4	倍
HA抗体	HA抗体IgG	HA抗体				1	
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ				0.8	
単純ﾍﾙﾍﾟｽ	単純ﾍﾙﾍﾟｽ(CF)	単純ﾍﾙﾍﾟ				4	倍
S/CO	S/CO	S/CO				1	
IgGｲﾝﾃﾞｯｸｽ	IgGインデックス	IgGｲﾝﾃﾞｯ				0.9	
IgAｲﾝﾃﾞｯｸｽ	IgAインデックス	IgAｲﾝﾃﾞｯ				0.9	
IgMｲﾝﾃﾞｯｸｽ	IgMｲﾝﾃﾞｯｸｽ	IgMｲﾝﾃﾞｯ				0.9	
RSｳｲﾙｽ	RSｳｲﾙｽ(CF)	RSｳｲﾙｽ				4	倍
EIA価	EIA価	EIA価			0	2.00	
抗体指数	抗体指数	抗体指数			0	0.8	
HCVｺｱ蛋白HS	HCVｺｱ蛋白-HS	HCVｺｱ蛋			0	3.0	fmol/L
EIA価	EIA価	EIA価			0	2.0	
抗体指数	抗体指数	抗体指数			0	0.8	
ｱﾐﾛｲﾄﾞA蛋白	血清ｱﾐﾛｲﾄﾞA蛋白(SAA)	ｱﾐﾛｲﾄﾞA				8	μg/ml
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ				10	
風疹(HI)	風疹(HI)	風疹(HI)				8	倍
麻疹ｳｲﾙｽ(PA)	麻疹ｳｲﾙｽ(PA)	麻疹ｳｲﾙｽ				16	倍
HBV-PCR定量	HBV-PCR定量	HBV定量			0	1.0	LogIU/mL
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ				2	
ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ抗	ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ抗体	ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞ				160	倍
抗体価	抗体価	抗体価				6	IU/ml
COI	COI	COI				0.8	C.O.I
梅毒定量TPHA	梅毒定量TPHA	梅毒定量				80	倍
TPHA判定	TPHA判定	TPHA判定			0	79	
x赤痢ｱﾒｰﾊﾞ	x赤痢ｱﾒｰﾊﾞ抗体(FA)受託中止	x赤痢ｱﾒｰ				100	倍
抗体濃度	抗体濃度	抗体濃度			0	10	U/ml
ﾑﾝﾌﾟｽｳｲﾙｽ(CF	ﾑﾝﾌﾟｽｳｲﾙｽ(CF)	ﾑﾝﾌﾟｽｳｲﾙ				4	倍
抗ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾ	抗ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ(ASK)	抗ｽﾄﾚﾌﾟﾄ				2560	倍
ｻｲﾄﾒｶﾞﾛ抗体	ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ(CF)	ｻｲﾄﾒｶﾞﾛ				4	倍
抗抗酸菌抗体	抗抗酸菌抗体(抗TBGL)	抗抗酸菌				2	U/ml
抗体指数	抗体指数	抗体指数				0.8	
抗体指数	抗体指数	抗体指数				0.8	
ﾎﾟﾘｵⅠ型(CF)	ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽⅠ型(CF)	ﾎﾟﾘｵⅠ型				4	倍
ﾎﾟﾘｵⅡ型(CF)	ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽⅡ型(CF)	ﾎﾟﾘｵⅡ型				4	倍
ﾎﾟﾘｵ3型(CF)	ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ3型(CF)	ﾎﾟﾘｵ3型				4	倍
ﾎﾟﾘｵ1型(NT)	ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ1型(NT)	ﾎﾟﾘｵ1型				4	倍
ﾎﾟﾘｵ2型(NT)	ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ2型(NT)	ﾎﾟﾘｵ2型				4	倍
ﾎﾟﾘｵ3型(NT)	ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ3型(NT)	ﾎﾟﾘｵ3型				4	倍
S/CO	S/CO	S/CO				1	
C.O.I	C.O.I	C.O.I			0	1.0	
阻害率	阻害率	阻害率				50	%
INH	INH	INH			0	60	%
未)HBV DNA-ﾎﾟﾘﾒ	HBV DNA-ﾎﾟﾘﾒﾗｰｾﾞ	HBV DNA-				30	cpm
総胆汁酸	総胆汁酸(TBA)	総胆汁酸				10	μmol/l
総ｹﾄﾝ体	総ｹﾄﾝ体	総ｹﾄﾝ体				130	μmol/l
ｱｾﾄ酢酸	ｱｾﾄ酢酸	ｱｾﾄ酢酸				55	μmol/l
3ﾋﾄﾞﾛ	3ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪酸	3ﾋﾄﾞﾛ				85	μmol/l
銅(血中)	銅(血中)	銅(血中)		男	80	130	μg/dl
				女	100	150	μg/dl
ﾘｿﾞﾁｰﾑ血清	ﾘｿﾞﾁｰﾑ血清	ﾘｿﾞﾁｰﾑ血			5.0	10.0	μg/ml
未)ﾘｿﾞﾁｰﾑ尿	未)ﾘｿﾞﾁｰﾑ尿	ﾘｿﾞﾁｰﾑ尿			0.0		μg/ml
PSTI	PSTI	PSTI			4.6	20.0	ng/ml
MAO	ﾓﾉｱﾐﾝｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ(MAO)	MAO			0.2	0.9	U/l
ICTP	Ⅰ型ｺﾗｰｹﾞﾝC末端TP	ICTP				5.5	ng/ml
P-Ⅲ-P	ﾌﾟﾛｺﾗｰｹﾞﾝⅢﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ	P-Ⅲ-P			0.30	0.80	U/ml
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(Mg)	ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(Mg)	ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(			1.7	2.6	mg/dl
ｸﾚｱﾁﾝ	ｸﾚｱﾁﾝ	ｸﾚｱﾁﾝ			0.3	1.2	mg/dl
ﾁﾓｰﾙ(TTT)	ﾁﾓｰﾙ(TTT)	ﾁﾓｰﾙ(TTT			0.5	6.5	U

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
ｾﾚﾝ	ｾﾚﾝ	ｾﾚﾝ			107	171	μg/l
PAM	PAM	PAM				0.6	ng/ml
PAL	PAL	PAL		男	6.0	40.0	ng/ml
				女	4.0	19.0	ng/ml
PIN	PIN	PIN				3	ng/ml
尿ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ	尿ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ(ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ)	尿ｱﾄﾞﾚﾅﾘ			3.4	26.9	μg/day
尿ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ	尿ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ(ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘ	尿ﾉﾙｱﾄﾞﾚ			48.6	168.4	μg/day
尿ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ	尿ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝ	尿ﾄﾞｰﾊﾟﾐ			365.0	961.5	μg/day
尿ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ(LSI	_尿ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ(ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ)LSI	_尿ｱﾄﾞﾚﾅ			1.1	22.5	μg/day
尿ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘ(LSI	_尿ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘ(ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌ	_尿ﾉﾙｱﾄﾞ			29.2	118	μg/day
尿ﾄﾞｰﾊﾟﾐ(LSI	_尿ﾄﾞｰﾊﾟﾐ	_尿ﾄﾞｰﾊﾟ			100	1000	μg/day
VMA	VMA	VMA			1.50	4.90	mg/day
高感度PTH	HS-PTH(副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ)	高感度PT			74	273	pg/ml
TBG定量	TBG定量	TBG定量			15.9	35.6	μg/ml
PTHｲﾝﾀｸﾄ	副甲状腺ﾎﾙﾓﾝｰｲﾝﾀｸﾄ	PTHｲﾝﾀｸﾄ			10	65	pg/ml
IAP	IAP(免疫抑制酸性蛋白	IAP				500	μg/ml
ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ	ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ	ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞ			12.4	16.3	%
尿中HVA定量	尿中HVA定量	尿中HVA			1.0	10.3	
HVA/CRE	HVA/CRE	HVA/CRE			2.20	5.80	mg/g･Cr
ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ	ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ	ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ			0.04	0.19	mg/day
ﾉﾙﾒﾀﾈﾌﾘﾝ	ﾉﾙﾒﾀﾈﾌﾘﾝ	ﾉﾙﾒﾀﾈﾌﾘﾝ			0.09	0.33	mg/day
ﾘﾎﾟ蛋白(a)	ﾘﾎﾟ蛋白(a)	ﾘﾎﾟ蛋白a				40	mg/dl
SPan-1	SPan-1	SPan-1				30	U/ml
ｾﾙﾛﾌﾟﾗｽﾐﾝ	ｾﾙﾛﾌﾟﾗｽﾐﾝ	ｾﾙﾛﾌﾟﾗｽﾐ			21	37	mg/dl
HCG-血清	絨毛性ｺﾞﾅﾄﾞﾄﾛﾋﾟﾝ-血	HCG-血清				2.7	mIU/ml
HCG-尿	絨毛性ｺﾞﾅﾄﾞﾄﾛﾋﾟﾝ-尿	HCG-尿				0.7	mIU/ml
遊離脂肪酸	遊離脂肪酸(FFA,NEFA)	遊離脂肪			0.10	0.81	mEq/l
ﾘﾝ脂質	ﾘﾝ脂質(PL)	ﾘﾝ脂質			150	250	mg/dl
1.25(OH)2VD	1.25-(OH)2ﾋﾞﾀﾐﾝD	1.25(OH)			20.0	60.0	pg/ml
ﾋﾞﾀﾐﾝE(未保)	ﾋﾞﾀﾐﾝE(蛍光法)	ﾋﾞﾀﾐﾝE未			0.75	1.41	mg/dl
HCGβ	HCG-β	HCGβ				0.1	ng/mL
β-LP	β-リポ蛋白	β-LP		男	150	600	mg/dl
				女	130	430	mg/dl
亜鉛(血･Zn)	亜鉛(血中)	亜鉛(血Z			65	110	μg/dl
IV型ｺﾗｰｹﾞﾝ	IV型ｺﾗｰｹﾞﾝ	IV型ｺﾗｰｹ				150	ng/ml
ﾘﾊﾟｰｾﾞ	ﾘﾊﾟｰｾﾞ	ﾘﾊﾟｰｾﾞ			11	53	U/L
ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ	ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ	ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ		男	3.58	12.7	ng/ml
				女	6.12	30.5	ng/ml
ｶﾙｼﾄﾝ(LSI用)	ｶﾙｼﾄﾆﾝ(ECLIA)LSI	ｶﾙｼﾄﾆﾝ新		男	0	5.15	pg/ml
				女	0	3.91	pg/ml
ｸﾚｱﾁﾝ(蓄尿)	ｸﾚｱﾁﾝ(蓄尿)	ｸﾚｱﾁﾝ(蓄		男		0.2	g/day
				女		0.43	g/day
PICﾃｽﾄ	α2ﾌﾟﾗｽﾐﾝｲﾝﾌｨﾋﾞﾀｰ複	PICﾃｽﾄ				0.8	μg/ml
第13因子活性	第13因子活性	13因活性			70	140	%
ﾌﾟﾛﾃｲﾝC活性	ﾌﾟﾛﾃｲﾝC活性	ﾌﾟﾛﾃC活			64	135	%
ﾌﾟﾛﾃｲﾝC抗原	ﾌﾟﾛﾃｲﾝC(抗原量)	ﾌﾟﾛﾃC抗			62	131	%
ﾌﾟﾛﾃｲﾝS活性	ﾌﾟﾛﾃｲﾝS活性	ﾌﾟﾛﾃS活			60	150	%
NAG(蓄尿)	N-ｱｾﾁﾙｸﾞﾙｺｻﾐﾆﾀﾞｰｾﾞ	NAG蓄尿			0.0	10.0	60
FDP定量(尿)	FDP定量(尿)	FDP(尿)				0.1	ng/ml
CAI	ﾄﾘｺｽﾎﾟﾛﾝ　CAI	CAI				0.15	
ALB/Cre	尿ｱﾙﾌﾞﾐﾝ(CRE換算)	ALB/Cre			0.0	10.0	mg/g・Cr
ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ	ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ	ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ		男	1.31	8.71	ng/mL
				女	0.11	0.47	ng/mL
ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ(BML)	ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ(BML)	ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ		男	142.4	923.1	ng/dL
				女	10.8	56.9	ng/dL
未)ｺﾙﾁｺｽﾃﾛﾝ	ｺﾙﾁｺｽﾃﾛﾝ×保	ｺﾙﾁｺｽﾃﾛﾝ		男	0.38	8.42	
				女	0.21	8.48	
1型中和抗体	1型中和抗体	1型中和				4	倍　希釈
2型中和抗体	2型中和抗体	2型中和				4	倍　希釈
PTH-rP	PTH-rP	PTH-rP				1.1	pmol/l
ACP(酸性ﾌｫｽ)	ACP(酸性ﾌｫｽﾌｧﾀｰｾﾞ)	ACP(酸ﾌｫ			5.9	14.0	U/l
PAP(前立腺酸	PAP　中止	PAP(前立				2.9	U/l
PAP-RIA	PAP-RIA	PAP-RIA				3	ng/ml
抗ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	抗ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ抗体	抗ｻｲﾛｸﾞﾛ				28	IU/ml
尿中ｺﾙﾁ(遊離	尿中ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ(遊離)	尿ｺﾙﾁ(遊			11.2	80.3	μg/day
蓄ﾎﾟﾙﾌｫﾋﾞﾘﾉｹﾞﾝ	蓄)ﾎﾟﾙﾌｫﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ	蓄ﾎﾟﾙﾌｫ				2	mg/day

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
11-OHCS(血)	11-OHCS(血中)	11-OHCS(			7.0	23.0	μg/dl
β-TG	β-ﾄﾛﾝﾎﾞｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ(βTG	β-TG			0	60	ng/ml
PF-4	血小板第4因子(PF-4)	PF-4			0	20	ng/ml
TARC中止	TARC(中止	TARC				450	pg/ml
κ型	κ型	κ型			3.3	19.4	mg/L
λ型	λ型	λ型			5.7	26.3	mg/L
κ/λ比	κ/λ比	κ/λ比			0.26	1.65	
第Ⅷ因子活性	第Ⅷ因子活性	第Ⅷ因子			60	150	%
ｱﾝﾁﾌﾟﾗｽﾐﾝ	ｱﾝﾁﾌﾟﾗｽﾐﾝ(α2-PI)	ｱﾝﾁﾌﾟﾗｽﾐ			85	115	%
ﾌﾟﾗｽﾐﾉｰｹﾞﾝ	ﾌﾟﾗｽﾐﾉｰｹﾞﾝ	ﾌﾟﾗｽﾐﾉｰｹ			75	125	%
ADH	ADH(抗利尿ﾎﾙﾓﾝ)	ADH				4.2	pg/ml
_α	_α	_α			4.90	13.80	μg/mL
_β	_β	_β			0.06	0.28	μg/mL
_γ	_γ	_γ			0.10	2.40	μg/mL
_δ	_δ	_δ			0	0.14	μg/mL
ﾊﾙｶﾞﾔ	はるがや	ﾊﾙｶﾞﾔ				0.35	UA/ml
ｷﾞｮｳｷﾞｼﾊﾞ	ぎょうぎしば	ｷﾞｮｳｷﾞｼﾊ				0.35	UA/ml
ｶﾓｶﾞﾔ	かもがや	ｶﾓｶﾞﾔ				0.35	UA/ml
ﾋﾛﾊｳｼﾉｹｸﾞｻ	ひろはうしのけぐさ	ﾋﾛﾊｳｼﾉｹｸ				0.35	UA/ml
ﾎｿﾑｷﾞ	ほそむぎ	ﾎｿﾑｷﾞ				0.35	UA/ml
ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ	おおあわがえり	ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ				0.35	UA/ml
ｱｼ	あし	ｱｼ				0.35	UA/ml
ﾅｶﾞﾊｸﾞｻ	ながはぐさ	ﾅｶﾞﾊｸﾞｻ				0.35	UA/ml
ｺﾇｶｸﾞｻ(属)	こぬかぐさ(属)	ｺﾇｶｸﾞｻ属				0.35	UA/ml
ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ	せいばんもろこし	ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺ				0.35	UA/ml
小麦(属)	小麦(属)(花粉)	小麦(属)				0.35	UA/ml
ｵｵｽｽﾞﾒﾉﾃｯﾎﾟｳ	おおすずめのてっぽう	ｵｵｽｽﾞﾒﾉﾃ				0.35	UA/ml
ｽｽﾞﾒﾉﾋｴ(属)	すずめのひえ(属)	ｽｽﾞﾒﾉﾋｴ(				0.35	UA/ml
ﾌﾞﾀｸｻ	ぶたくさ	ﾌﾞﾀｸｻ				0.35	UA/ml
ﾌﾞﾀｸｻﾓﾄﾞｷ	ぶたくさもどき	ﾌﾞﾀｸｻﾓﾄﾞ				0.35	UA/ml
ｵｵﾌﾞﾀｸｻ	おおぶたくさ	ｵｵﾌﾞﾀｸｻ				0.35	UA/ml
ﾆｶﾞﾖﾓｷﾞ	にがよもぎ	ﾆｶﾞﾖﾓｷﾞ				0.35	UA/ml
ﾖﾓｷﾞ	よもぎ	ﾖﾓｷﾞ				0.35	UA/ml
ﾌﾗﾝｽｷﾞｸ	ふらんすぎく	ﾌﾗﾝｽｷﾞｸ				0.35	UA/ml
ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ(属)	たんぽぽ(属)	ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ属				0.35	UA/ml
ﾍﾗｵｵﾊﾞｺ	へらおおばこ	ﾍﾗｵｵﾊﾞｺ				0.35	UA/ml
ｼﾛｻﾞ	しろざ	ｼﾛｻﾞ				0.35	UA/ml
ｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ	あきのきりんそう	ｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ				0.35	UA/ml
ﾋﾒｽｲﾊﾞ	ひめすいば	ﾋﾒｽｲﾊﾞ				0.35	UA/ml
ｲﾗｸｻ(属)	いらくさ(属)	ｲﾗｸｻ(属				0.35	UA/ml
ｶﾅﾑｸﾞﾗ	かナムグラ	ｶﾅﾑｸﾞﾗ				0.35	UA/ml
ｶｴﾃﾞ(属)	かえで(属)	ｶｴﾃﾞ(属				0.35	UA/ml
ﾊﾝﾉｷ(属)	はんのき(属)	ﾊﾝﾉｷ(属				0.35	UA/ml
ｼﾗｶﾝﾊﾞ(属)	しらかんば(属)	ｼﾗｶﾝ(属				0.35	UA/ml
ﾌﾞﾅ(属)	ぶな(属)	ﾌﾞﾅ(属)				0.35	UA/ml
ﾋﾞｬｸｼﾝ(属)	びゃくしん(属)	ﾋﾞｬｸｼ(属				0.35	UA/ml
ｺﾅﾗ(属)	こなら(属)	ｺﾅﾗ(属)				0.35	UA/ml
ﾆﾚ(属)	にれ(属)	ﾆﾚ(属)				0.35	UA/ml
ｵﾘｰﾌﾞ	ｵﾘｰﾌﾞ	ｵﾘｰﾌﾞ				0.35	UA/ml
ｸﾙﾐ(属)	くるみ(属)	ｸﾙﾐ(属)				0.35	UA/ml
ﾔﾅｷﾞ(属)	やなぎ(属)	ﾔﾅｷﾞ(属				0.35	UA/ml
ﾏﾂ(属)	まつ(属)	ﾏﾂ(属)				0.35	UA/ml
ｽｷﾞ	すぎ	ｽｷﾞ				0.35	UA/ml
ｱｶｼｱ(属)	ｱｶｼｱ(属)	ｱｶｼｱ(属				0.35	UA/ml
ﾋﾉｷ	ﾋﾉｷ	ﾋﾉｷ				0.35	UA/ml
ｸﾜ(属)	くわ(属)	ｸﾜ(属)				0.35	UA/ml
ﾔｹﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ	ﾔｹﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ	ﾔｹﾋｮｳﾋﾀﾞ				0.35	UA/ml
ｺﾅﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ	ｺﾅﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ	ｺﾅﾋｮｳﾋﾀﾞ				0.35	UA/ml
ｱｼﾌﾞﾄｺﾅﾀﾞﾆ	ｱｼﾌﾞﾄｺﾅﾀﾞﾆ	ｱｼﾌﾞﾄｺﾅﾀ				0.35	UA/ml
ｻﾔｱｼﾆｸﾀﾞﾆ	ｻﾔｱｼﾆｸﾀﾞﾆ	ｻﾔｱｼﾆｸﾀﾞ				0.35	UA/ml
ｹﾅｶﾞｺﾅﾀﾞﾆ	ｹﾅｶﾞｺﾅﾀﾞﾆ	ｹﾅｶﾞｺﾅﾀﾞ				0.35	UA/ml
ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1	ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1	ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1				0.35	UA/ml
ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ2	ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ2	ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ2				0.35	UA/ml
ﾍﾟﾆｼﾘｳﾑ	ﾍﾟﾆｼﾘｳﾑ	ﾍﾟﾆｼﾘｳﾑ				0.35	UA/ml
ｸﾗﾄﾞｽﾎﾟﾘｳﾑ	ｸﾗﾄﾞｽﾎﾟﾘｳﾑ	ｸﾗﾄﾞｽﾎﾟﾘ				0.35	UA/ml
Aspｱﾚﾙｹﾞﾝ	ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ(ｱﾚﾙｹﾞﾝ	Aspｱﾚﾙｹﾞ				0.35	UA/ml

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
ﾑｺｰﾙ	ﾑｺｰﾙ	ﾑｺｰﾙ				0.35	UA/ml
ｶﾝｼﾞﾀﾞ	ｶﾝｼﾞﾀﾞ	ｶﾝｼﾞﾀﾞ				0.35	UA/ml
ｱﾙﾃﾙﾅﾘｱ	ｱﾙﾃﾙﾅﾘｱ	ｱﾙﾃﾙﾅﾘｱ				0.35	UA/ml
ﾍﾙﾐﾝﾄｽﾎﾟﾘｳﾑ	ﾍﾙﾐﾝﾄｽﾎﾟﾘｳﾑ	ﾍﾙﾐﾝﾄｽﾎﾟ				0.35	UA/ml
ﾋﾟﾃｨﾛｽﾎﾟﾘｳﾑ	ﾋﾟﾃｨﾛｽﾎﾟﾘｳﾑ	ﾋﾟﾃｨﾛｽﾎﾟ				0.35	UA/ml
黄色ﾌﾞﾄﾞｳA	黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌A	黄色ﾌﾞA				0.35	UA/ml
黄色ﾌﾞﾄﾞｳB	黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌B	黄色ﾌﾞB				0.35	UA/ml
ﾄﾘｺﾌｨﾄﾝ	ﾄﾘｺﾌｨﾄﾝ	ﾄﾘｺﾌｨﾄﾝ				0.35	UA/ml
ﾈｺ皮屑	ﾈｺ皮屑	ﾈｺ皮屑				0.35	UA/ml
×ｲﾇ皮屑	ｲﾇ皮屑	ｲﾇ皮屑				0.35	UA/ml
ｳﾏ皮屑	ｳﾏ皮屑	ｳﾏ皮屑				0.35	UA/ml
ｳｼ皮屑	ｳｼ皮屑	ｳｼ皮屑				0.35	UA/ml
ｲﾇ皮屑	ｲﾇ皮屑	ｲﾇ皮屑				0.34	UA/ml
ﾓﾙﾓｯﾄ上皮	ﾓﾙﾓｯﾄ上皮	ﾓﾙﾓｯﾄ				0.34	UA/ml
ﾊﾄﾉﾌﾝ	ﾊﾄのふん	ﾊﾄﾉﾌﾝ				0.34	UA/ml
ｶﾞﾁｮｳ羽毛	ｶﾞﾁｮｳ羽毛	ｶﾞﾁｮｳ羽				0.34	UA/ml
ｾｷｾｲｲﾝｺﾉﾌﾝ	ｾｷｾｲｲﾝｺのふん	ｾｷｾｲｲﾝｺﾉ				0.34	UA/ml
ｾｷｾｲｲﾝｺ羽毛	ｾｷｾｲｲﾝｺ羽毛	ｾｷｾｲｲﾝｺ				0.34	UA/ml
ｾｷｾｲｲﾝｺ血清P	ｾｷｾｲｲﾝｺ血清蛋白	ｾｷｾｲｲﾝｺ				0.34	UA/ml
ﾔｷﾞ上皮	ﾔｷﾞ上皮	ﾔｷﾞ上皮				0.34	UA/ml
羊上皮	羊上皮	羊上皮				0.34	UA/ml
家兎上皮	家兎上皮	家兎上皮				0.34	UA/ml
豚上皮	豚上皮	豚上皮				0.34	UA/ml
ﾊﾑｽﾀｰ上皮	ﾊﾑｽﾀｰ上皮	ﾊﾑｽﾀ上皮				0.34	UA/ml
ﾆﾜﾄﾘ羽毛	ﾆﾜﾄﾘ羽毛	ﾆﾜﾄﾘ羽毛				0.34	UA/ml
ｱﾋﾙ羽毛	ｱﾋﾙ羽毛	ｱﾋﾙ羽毛				0.34	UA/ml
ﾗｯﾄ	ﾗｯﾄ	ﾗｯﾄ				0.34	UA/ml
ﾏｳｽ	ﾏｳｽ	ﾏｳｽ				0.34	UA/ml
ｶｲﾁｭｳ	ｶｲﾁｭｳ	ｶｲﾁｭｳ				0.34	UA/ml
ﾎｳﾁｭｳ	ﾎｳﾁｭｳ	ﾎｳﾁｭｳ				0.34	UA/ml
ｱﾆｻｷｽ	ｱﾆｻｷｽ	ｱﾆｻｷｽ				0.34	UA/ml
ﾐﾂﾊﾞﾁ	ﾐﾂﾊﾞﾁ	ﾐﾂﾊﾞﾁ				0.34	UA/ml
ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ	ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ	ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ				0.34	UA/ml
ｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ	ｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ	ｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ				0.34	UA/ml
ｺﾞｷﾌﾞﾘ	ｺﾞｷﾌﾞﾘ	ｺﾞｷﾌﾞﾘ				0.34	UA/ml
ﾕｽﾘｶ(成虫)	ﾕｽﾘｶ(成虫)	ﾕｽﾘｶ(成)				0.34	UA/ml
ｶﾞ	ｶﾞ	ｶﾞ				0.34	UA/ml
ﾔﾌﾞｶ(属)	ﾔﾌﾞｶ(属)	ﾔﾌﾞｶ(属)				0.34	UA/ml
絹	絹	絹				0.34	UA/ml
ｵｵﾊﾞｺ種子	ｵｵﾊﾞｺ種子	ｵｵﾊﾞｺ種				0.34	UA/ml
ｲｿｼｱﾈｰﾄTDI	ｲｿｼｱﾈｰﾄTDI	ｲｿｼｱﾈｰﾄT				0.34	UA/ml
ｲｿｼｱﾈｰﾄMDI	ｲｿｼｱﾈｰﾄMDI	ｲｿｼｱﾈｰﾄM				0.34	UA/ml
ｲｿｼｱﾈｰﾄHDI	ｲｿｼｱﾈｰﾄHDI	ｲｿｼｱﾈｰﾄH				0.34	UA/ml
ｴﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ	ｴﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ	ｴﾁﾚﾝｵｷｻｲ				0.34	UA/ml
無水ﾌﾀﾙ酸	無水ﾌﾀﾙ酸	無水ﾌﾀﾙ				0.34	UA/ml
ﾎﾙﾏﾘﾝ	ﾎﾙﾏﾘﾝ	ﾎﾙﾏﾘﾝ				0.34	UA/ml
ﾗﾃｯｸｽ	ﾗﾃｯｸｽ	ﾗﾃｯｸｽ				0.34	UA/ml
卵白	卵白	卵白				0.34	UA/ml
ﾐﾙｸ	ﾐﾙｸ	ﾐﾙｸ				0.34	UA/ml
ﾀﾗ	ﾀﾗ	ﾀﾗ				0.34	UA/ml
小麦	小麦	小麦				0.34	UA/ml
ﾗｲ麦	ﾗｲ麦	ﾗｲ麦				0.34	UA/ml
大麦	大麦	大麦				0.34	UA/ml
ｵｰﾄ麦	ｵｰﾄ麦	ｵｰﾄ麦				0.34	UA/ml
ﾄｳﾓﾛｺｼ	とうもろこし	ﾄｳﾓﾛｺｼ				0.34	UA/ml
米	米	米				0.34	UA/ml
ｺﾞﾏ	ごま	ｺﾞﾏ				0.34	UA/ml
ｿﾊﾞ	そば	ｿﾊﾞ				0.34	UA/ml
ｴﾝﾄﾞｳ	えんどう	ｴﾝﾄﾞｳ				0.34	UA/ml
ﾋﾟｰﾅｯﾂ	ﾋﾟｰﾅｯﾂ	ﾋﾟｰﾅｯﾂ				0.34	UA/ml
大豆	大豆	大豆				0.34	UA/ml
ｲﾝｹﾞﾝ	いんげん	ｲﾝｹﾞﾝ				0.34	UA/ml
ﾊｼﾊﾞﾐ(実)	はしばみ（の実）	ﾊｼﾊﾞﾐ(実				0.34	UA/ml
ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾅｯﾂ	ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾅｯﾂ	ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾅｯ				0.34	UA/ml
ｱｰﾓﾝﾄﾞ	ｱｰﾓﾝﾄﾞ	ｱｰﾓﾝﾄﾞ				0.34	UA/ml
ｶﾆ	ｶﾆ	ｶﾆ				0.34	UA/ml

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
ｴﾋﾞ	ｴﾋﾞ	ｴﾋﾞ				0.34	UA/ml
ﾄﾏﾄ	ﾄﾏﾄ	ﾄﾏﾄ				0.34	UA/ml
豚肉	豚肉	豚肉				0.34	UA/ml
牛肉	牛肉	牛肉				0.34	UA/ml
ﾆﾝｼﾞﾝ	にんじん	ﾆﾝｼﾞﾝ				0.34	UA/ml
ｵﾚﾝｼﾞ	ｵﾚﾝｼﾞ	ｵﾚﾝｼﾞ				0.34	UA/ml
ｼﾞｬｶﾞｲﾓ	じゃがいも	ｼﾞｬｶﾞｲﾓ				0.34	UA/ml
ｺｺﾅｯﾂ	ｺｺﾅｯﾂ	ｺｺﾅｯﾂ				0.34	UA/ml
ﾑﾗｻｷｲｶﾞｲ	ﾑﾗｻｷｲｶﾞｲ	ﾑﾗｻｷｲｶﾞｲ				0.34	UA/ml
ﾏｸﾞﾛ	まぐろ	ﾏｸﾞﾛ				0.34	UA/ml
ｻｹ	さけ	ｻｹ				0.34	UA/ml
ｲﾁｺﾞ	いちご	ｲﾁｺﾞ				0.34	UA/ml
ﾋﾞｰﾙ酵母	ﾋﾞｰﾙ酵母	ﾋﾞｰﾙ酵母				0.34	UA/ml
ﾆﾝﾆｸ	にんにく	ﾆﾝﾆｸ				0.34	UA/ml
ﾀﾏﾈｷﾞ	たまねぎ	ﾀﾏﾈｷﾞ				0.34	UA/ml
ﾘﾝｺﾞ	ﾘﾝｺﾞ	ﾘﾝｺﾞ				0.34	UA/ml
ｻﾊﾞ	ｻﾊﾞ	ｻﾊﾞ				0.34	UA/ml
ﾀｹﾉｺ	ﾀｹﾉｺ	ﾀｹﾉｺ				0.34	UA/ml
ｻﾂﾏｲﾓ	ｻﾂﾏｲﾓ	ｻﾂﾏｲﾓ				0.34	UA/ml
ｷﾋﾞ	ｷﾋﾞ	ｷﾋﾞ				0.34	UA/ml
ｱﾜ	ｱﾜ	ｱﾜ				0.34	UA/ml
ﾋｴ	ﾋｴ	ﾋｴ				0.34	UA/ml
ｲｶ	ｲｶ	ｲｶ				0.34	UA/ml
ﾀｺ	ﾀｺ	ﾀｺ				0.34	UA/ml
ｱｼﾞ	ｱｼﾞ	ｱｼﾞ				0.34	UA/ml
ｲﾜｼ	ｲﾜｼ	ｲﾜｼ				0.34	UA/ml
卵黄	卵黄	卵黄				0.34	UA/ml
α-ﾗｸﾄｱﾙﾌﾞﾐﾝ	α-ﾗｸﾄｱﾙﾌﾞﾐﾝ	α-ﾗｸﾄｱ				0.34	UA/ml
β-ﾗｸﾄｸﾞﾛﾌﾞﾘ	β-ﾗｸﾄｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	β-ﾗｸﾄｸﾞ				0.34	UA/ml
ｶｾﾞｲﾝ	ｶｾﾞｲﾝ	ｶｾﾞｲﾝ				0.34	UA/ml
ｸﾞﾙﾃﾝ	ｸﾞﾙﾃﾝ	ｸﾞﾙﾃﾝ				0.34	UA/ml
ﾛﾌﾞｽﾀｰ	ﾛﾌﾞｽﾀｰ	ﾛﾌﾞｽﾀｰ				0.34	UA/ml
ﾁｰｽﾞ	ﾁｰｽﾞ	ﾁｰｽﾞ				0.34	UA/ml
鶏肉	鶏肉	鶏肉				0.34	UA/ml
ｷｳｲ	ｷｳｲ	ｷｳｲ				0.34	UA/ml
ｾﾛﾘ	ｾﾛﾘ	ｾﾛﾘ				0.34	UA/ml
ﾊﾟｾﾘ	ﾊﾟｾﾘ	ﾊﾟｾﾘ				0.34	UA/ml
ﾒﾛﾝ	ﾒﾛﾝ	ﾒﾛﾝ				0.34	UA/ml
羊肉	羊肉	羊肉				0.34	UA/ml
ﾏｽﾀｰﾄﾞ	ﾏｽﾀｰﾄﾞ	ﾏｽﾀｰﾄﾞ				0.34	UA/ml
麦芽	麦芽	麦芽				0.34	UA/ml
ﾏﾝｺﾞ	ﾏﾝｺﾞ	ﾏﾝｺﾞ				0.34	UA/ml
ﾓｰﾙﾄﾞﾁｰｽﾞ	ﾓｰﾙﾄﾞﾁｰｽﾞ	ﾓｰﾙﾄﾞﾁｰｽ				0.34	UA/ml
ﾊﾞﾅﾅ	ﾊﾞﾅﾅ	ﾊﾞﾅﾅ				0.34	UA/ml
ｶｶｵ	ｶｶｵ	ｶｶｵ				0.34	UA/ml
洋ﾅｼ	洋なし	洋ﾅｼ				0.34	UA/ml
ﾓﾓ	ﾓﾓ	ﾓﾓ				0.34	UA/ml
ｱﾎﾞｶﾄﾞ	ｱﾎﾞｶﾄﾞ	ｱﾎﾞｶﾄﾞ				0.34	UA/ml
ｱｻﾘ	ｱｻﾘ	ｱｻﾘ				0.34	UA/ml
ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ	ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ	ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙ				0.34	UA/ml
ﾎｳﾚﾝｿｳ	ﾎｳﾚﾝｿｳ	ﾎｳﾚﾝｿｳ				0.34	UA/ml
ｶﾎﾞﾁｬ	ｶﾎﾞﾁｬ	ｶﾎﾞﾁｬ				0.34	UA/ml
ｵﾎﾞﾑｺｲﾄﾞ	ｵﾎﾞﾑｺｲﾄﾞ	ｵﾎﾞﾑｺｲﾄﾞ				0.34	UA/ml
ｶﾚｲ	ｶﾚｲ	ｶﾚｲ				0.34	UA/ml
ｶｷ	ｶｷ	ｶｷ				0.34	UA/ml
ﾎﾀﾃ	ﾎﾀﾃ	ﾎﾀﾃ				0.34	UA/ml
ｲｸﾗ	ｲｸﾗ	ｲｸﾗ				0.34	UA/ml
ﾀﾗｺ	ﾀﾗｺ	ﾀﾗｺ				0.34	UA/ml
ﾋﾄｲﾝｼｭﾘﾝ	ﾋﾄｲﾝｼｭﾘﾝ	ﾋﾄｲﾝｼｭﾘﾝ				0.34	UA/ml
ｾﾞﾗﾁﾝ	ｾﾞﾗﾁﾝ	ｾﾞﾗﾁﾝ				0.34	UA/ml
綿	綿	綿				0.34	UA/ml
ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝｲﾈ	CAPﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝｲﾈ	ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞ				0.34	UA/ml
ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ雑	CAPﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ雑草	ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞ				0.34	UA/ml
ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ食	CAPﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ食物	ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞ				0.34	UA/ml
ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ穀	CAPﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ穀物	ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞ				0.34	UA/ml
ﾏﾙﾁ動物上皮	CAPﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ動物上皮	ﾏﾙﾁ動物				0.34	UA/ml

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝｶﾋﾞ	CAPﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝｶﾋﾞ	ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞ				0.34	UA/ml
ﾔﾏｲﾓ	ﾔﾏｲﾓ	ﾔﾏｲﾓ				0.34	UA/ml
ｺﾅﾋﾖｳﾋﾀﾞﾆ	ｺﾅﾋﾖｳﾋﾀﾞﾆ	ｺﾅﾋﾖｳﾋﾀﾞ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1	ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1	ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾈｺ皮屑	ﾈｺ皮屑	ﾈｺ皮屑				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｲﾇ皮屑	ｲﾇ皮屑	ｲﾇ皮屑				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ	ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ	ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾊﾙｶﾞﾔ	ﾊﾙｶﾞﾔ	ﾊﾙｶﾞﾔ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾌﾞﾀｸｻｺﾝｺﾞｳﾌﾂ	ﾌﾞﾀｸｻ混合物	ﾌﾞﾀｸｻｺﾝｺ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾖﾓｷﾞ	ﾖﾓｷﾞ	ﾖﾓｷﾞ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｽｷﾞ	ｽｷﾞ	ｽｷﾞ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾍﾟﾆｼﾘｳﾑ	ﾍﾟﾆｼﾘｳﾑ	ﾍﾟﾆｼﾘｳﾑ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｸﾗﾄﾞｽﾎﾟﾘｳﾑ	ｸﾗﾄﾞｽﾎﾟﾘｳﾑ	ｸﾗﾄﾞｽﾎﾟﾘ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｶﾝｼﾞﾀ	ｶﾝｼﾞﾀ	ｶﾝｼﾞﾀ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｱﾙﾃﾙﾅﾘｱ	ｱﾙﾃﾙﾅﾘｱ	ｱﾙﾃﾙﾅﾘｱ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ	ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ	ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｺﾑｷﾞ	ｺﾑｷﾞ	ｺﾑｷﾞ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾀﾞｲｽﾞ	ﾀﾞｲｽﾞ	ﾀﾞｲｽﾞ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｺﾒ	米	ｺﾒ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾏｸﾞﾛ	ﾏｸﾞﾛ	ﾏｸﾞﾛ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｻｹ	鮭	ｻｹ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｴﾋﾞ	ｴﾋﾞ	ｴﾋﾞ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｶﾆ	蟹	ｶﾆ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾁｪﾀﾞｰﾁｰｽﾞ	ﾁｪﾀﾞｰﾁｰｽﾞ	ﾁｪﾀﾞｰﾁｰｽ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾐﾙｸ	ﾐﾙｸ	ﾐﾙｸ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｷﾞｭｳﾆｸ	牛肉	ｷﾞｭｳﾆｸ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｹｲﾆｸ	鶏肉	ｹｲﾆｸ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾗﾝﾊﾟｸ	卵白	ﾗﾝﾊﾟｸ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｶﾓｶﾞﾔ	ｶﾓｶﾞﾔ	ｶﾓｶﾞﾔ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾋﾉｷ	ﾋﾉｷ	ﾋﾉｷ				1.4	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾊﾝﾉｷ	ﾊﾝﾉｷ	ﾊﾝﾉｷ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｼﾗｶﾝﾊﾞ	ｼﾗｶﾝﾊﾞ	ｼﾗｶﾝﾊﾞ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾗﾃｯｸｽ	ﾗﾃｯｸｽ	ﾗﾃｯｸｽ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｿﾊﾞ	ｿﾊﾞ	ｿﾊﾞ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾋﾟｰﾅﾂ	ﾋﾟｰﾅﾂ	ﾋﾟｰﾅﾂ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｽｲｶ	ｽｲｶ	ｽｲｶ				0.34	UA/ml
ｷｳｲ	ｷｳｲ	ｷｳｲ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾊﾞﾅﾅ	ﾊﾞﾅﾅ	ﾊﾞﾅﾅ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｺﾞﾏ	ｺﾞﾏ	ｺﾞﾏ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
豚肉	豚肉	豚肉				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ｵﾎﾞﾑｺｲﾄﾞ	ｵﾎﾞﾑｺｲﾄﾞ	ｵﾎﾞﾑｺｲﾄﾞ				1.39	ﾙﾐｶｳﾝﾄ
ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1 (ｸﾗｽ)	ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1 (ｸﾗｽ)	ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1			0	0	ｸﾗｽ
ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1	ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1	_測定値			0	0.27	INDX
IL-6	IL-6 (ｲﾝﾀｰﾛｲｷﾝ6)	IL-6				4	pg/ml
TNF-α	TNF-α (腫瘍壊死因子	TNF-α				6	pg/ml
IL-10	IL-10 (ｲﾝﾀｰﾛｲｷﾝ10)	IL-10				10	pg/ml
C26/C22	C26:0/C22:0	C26/C22			0.003	0.006	
C24/C22	C26/C22	C24/C22			0.628	0.977	
C25/C22	C25/C22	C25/C22			0.012	0.023	
ﾐｴﾘﾝ塩基性蛋	ﾐｴﾘﾝﾍﾞｰｼｯｸ蛋白 (MBP)	ﾐｴﾘﾝ塩基				102	pg/ml
ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ	ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ	ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ		男	0	154.9	ng/ml
				女	0	106.0	ng/ml
ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ(尿)	ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ(尿)	ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ				10	
SP-A	SP-A	SP-A				43.8	ng/ml
NCC-ST439	NCC-ST439	NCC-ST439		男		4.5	U/ml
			49歳以下	女		7.0	U/ml
			50歳以上			4.5	U/ml
P-ANCA (MPO)	P-ANCA (MPO-ANCA)	P-ANCA (M			0	3.5	U/mL
_濃度 (FEIA)	_濃度 (FEIA法201704から単位変更)	_濃度			0	3.5	IU/mL
_濃度 (FEIA)	_濃度 (FEIA法201704～単位変更	_濃度			0	2.0	IU/mL
抗GBM抗体	抗GBM抗体	抗GBM抗				3.0	U/mL
PT-IgG	PT-IgG	PT-IgG				10	EU/mL
FHA-IgG	FHA-IgG	FHA-IgG				10	EU/mL
ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ	ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ	ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁ			4.2	23.7	mIU/ml
抗RNP抗体	抗RNP抗体 (CLEIA)	抗RNP抗				10.0	U/mL
抗Scl-70抗体	抗Scl-70抗体 (CLEIA)	抗Scl-70			0	10.0	U/mL

項目名	正式結果名称	オーダ用名称	年齢	性別	下限値	上限値	単位
TARC(Th2ｹﾓｶｲﾝ)	TARC(Th2ｹﾓｶｲﾝ)	TARC	6～12ヶ月			1367	pg/mL
			1～2歳			998	pg/mL
			2歳以上			743	pg/mL
			成人			450	pg/mL
ﾊﾞﾙﾎﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ﾊﾞﾙﾎﾞB19IgMｲﾝﾃﾞｯｸｽ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ				0.80	
トータルPAI-1	トータルPAI-1(tPA・PAI-1複合体)	PAI-1				50	
尿中ﾄﾗﾝｽﾌｪﾘﾝ換算	尿中ﾄﾗﾝｽﾌｪﾘﾝ換算	尿中ﾄﾗﾝｽ			0	1.00	mg/gCre
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(Mg)蓄尿	ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(Mg)蓄尿	Mg蓄尿			0.10	0.20	
xTSHﾚｾﾌﾟﾀｰ2世	TSHﾚｾﾌﾟﾀｰ抗体　第二世代	TSHﾚｾ第2			0	1.0	IU/L
TSHﾚｾﾌﾟﾀｰ3世代	TSHﾚｾﾌﾟﾀｰ抗体　第三世代	TSHﾚｾ第3			0	2.0	IU/L
ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ蓄尿	ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ蓄尿	ｺﾙﾁ蓄尿			11.2	80.3	μg/day
CA602	CA602	CA602				63	U/mL
IgG4	IgG4	IgG4			4.8	105	mg/dL
第13因子抗原量	第13因子抗原量	13抗原量				70	
ﾁﾐｼﾞﾝｷﾅｰｾﾞ活性	ﾁﾐｼﾞﾝｷﾅｰｾﾞ活性	ﾁﾐｼﾞﾝ活				5.0	U/L
_Cre補正値	_Cre補正値	_Cre補正			2.10	5.00	mg/g.Cre
_Cre換算	_Cre換算	_Cre換算			2.20	5.80	mg/G.CRE
蓄尿5-HIAA	蓄尿5-HIAA	蓄尿5-HI			1.0	6.0	mg/day
抗ｱｸｱﾎﾟﾘﾝ4抗体	抗ｱｸｱﾎﾟﾘﾝ4抗体	ｱｸｱﾎﾟﾘﾝ4			0	3.0	U/mL
_α分画	_α分画(ｱｶﾞﾛｰｽEP)	_α分画		男	29	50	%
				女	34	53	%
_preβ分画	_preβ分画(ｱｶﾞﾛｰｽEP)	_preβ		男	8	29	%
				女	3	23	%
_β分画	_β分画(ｱｶﾞﾛｰｽEP)	_β分画		男	30	55	%
				女	33	53	%
_Cre換算値	L型脂肪酸結合蛋白(換算値)	_換算値			0.00	7.24	
M2BPGi	M2BPGi(Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性	M2BPGi			0.00	1.00	INDX
_COI	_COI	_COI			0	1.00	INDX
ｶﾙｼﾄﾆﾝ	ｶﾙｼﾄﾆﾝ(ECLIA)L用	ｶﾙｼﾄﾆﾝ		男	0	5.15	pg/ml
				女	0	3.91	pg/ml

確認日：　　年　　月　　日

責任医師署名：