

東名古屋フォーミュラー

①PPI/Pcab剤（内服薬）

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
胃潰瘍（GU）	ランソプラゾールOD錠 (小児はエソメプラゾールMg水和物のみ適応)	※エソメプラゾールカプセル
十二指腸潰瘍（DU）		
逆流性食道炎		
吻合部潰瘍		
Zollinger-Ellison症候群		
非びらん性胃食道逆流症		
低アスピリン投与時のGU、DUの再発抑制 NSAIDs投与時におけるGU、DUの再発抑制	ランソプラゾールOD錠	

※なお、簡易懸濁不可かつ散剤での投与が必要な場合のみ、ネキシウム懸濁用顆粒分包を使用。

②スタチン剤

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高コレステロール血症	ロスバスタチン錠・OD錠 (10歳以上の小児はビタバスタチンCa・OD錠のみ適応)	ビタバスタチンCa錠・OD錠 アトルバスタチン錠
家族性高コレステロール血症		

③フィbrate系高脂血症薬

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高脂血症	ベザフィbrate徐放錠 トライコア錠	

④H2遮断内服薬

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
胃潰瘍・十二指腸潰瘍・逆流性食道炎	ファモチジン錠・OD錠	
胃炎・慢性胃炎の急性増悪期の胃粘膜病変（びらん・出血・発赤・浮腫）の改善		
吻合部潰瘍		
上部消化管出血・Zollinger-Ellison症候群		

⑤尿酸生成阻害薬

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
痛風	フェブキソスタット錠	
高尿酸血症	アロプリノール錠	
がん化学療法に伴う高尿酸血症	フェブキソスタット錠	

⑥降圧薬（ARB）

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高血圧症	オルメサルタン錠・OD錠 テルミサルタン錠・OD錠 カンデサルタン錠・OD錠 (1歳以上の小児は、カンデサルタン錠・OD錠)	
腎実質性高血圧症	カンデサルタン錠・OD錠	
ACE阻害薬投与が適切でない慢性心不全		

⑦降圧薬（ACE阻害薬）

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
(本態性) 高血圧症	エナラプリルマレイン酸塩錠	イミダプリル塩酸塩錠
腎性高血圧症		
腎血管性高血圧症		
悪性高血圧症		
慢性心不全		
糖尿病性腎症（1型糖尿病）	イミダプリル塩酸塩錠	

⑧ビスホスホネート製剤内服薬

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
骨粗鬆症	リセドロン酸Na錠17.5mg (週1回投与)	

⑨糖尿病薬（α-グルコシダーゼ阻害薬）

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
糖尿病の食後過血糖の改善	ボグリボース錠・OD錠	ミグリトール錠
耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制		

⑩糖尿病薬（グリニド系薬）

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
2型糖尿病	レバグリニド錠 ミチグリニドCa・OD錠	

⑪ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬（成人高血圧症）

機能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高血圧症	アムロジピンOD錠 ニフェジピンCR錠	ベニジピン錠 シルニジピン錠

東名古屋病院薬事委員会
初版：令和4年7月15日
改訂：令和5年7月21日
追加：令和6年1月19日
追加：令和6年3月15日
追加：令和6年7月19日
追加：令和7年7月11日