

東名古屋フォーミュラー

①PPI/Pcab剤（内服薬）

| 効能・効果                   | 第一選択薬                                 | 第二選択薬         |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 胃潰瘍（GU）                 | ランソプラゾールOD錠<br>(小児はエソメプラゾールMg水和物のみ適応) | ※エソメプラゾールカプセル |
| 十二指腸潰瘍（DU）              |                                       |               |
| 逆流性食道炎                  |                                       |               |
| 吻合部潰瘍                   |                                       |               |
| Zollinger-Elison症候群     |                                       |               |
| 非びらん性胃食道逆流症             |                                       |               |
| 低アスピリン投与時のGU、DUの再発抑制    | ランソプラゾールOD錠                           |               |
| NSAIDと投与時におけるGU、DUの再発抑制 |                                       |               |

※なお、開封後服用不可かつ散剤での投与が必要な場合のみ、ネキシウム懸濁用顆粒分包を使用。

②スタチン剤

| 効能・効果         | 第一選択薬                                        | 第二選択薬                       |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 高コレステロール血症    | ロスバスタチン錠・OD錠<br>(10歳以上の小児はビタバスタチンCa・OD錠のみ適応) | ビタバスタチンCa錠・OD錠<br>アトルバスタチン錠 |
| 家族性高コレステロール血症 |                                              |                             |

③フィブラート系高脂血症薬

| 効能・効果 | 第一選択薬                 | 第二選択薬 |
|-------|-----------------------|-------|
| 高脂血症  | ベザフィブラート徐放錠<br>トライコア錠 |       |

④H2遮断内服薬

| 効能・効果                               | 第一選択薬       | 第二選択薬 |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| 胃潰瘍・十二指腸潰瘍・逆流性食道炎                   | ファモチジン錠・OD錠 |       |
| 胃炎・慢性胃炎の急増悪期の胃粘膜病変（びらん・出血・発赤・浮腫）の改善 |             |       |
| 吻合部潰瘍                               |             |       |
| 上部消化管出血・Zollinger-Elison症候群         |             |       |
|                                     |             |       |

⑤尿酸生成阻害薬

| 効能・効果          | 第一選択薬      | 第二選択薬 |
|----------------|------------|-------|
| 痛風             | フェブキシスタット錠 |       |
| 高尿酸血症          | アロプリノール錠   |       |
| がん化学療法に伴う高尿酸血症 | フェブキシスタット錠 |       |

⑥降圧薬（ARB）

| 効能・効果               | 第一選択薬                                                                   | 第二選択薬 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 高血圧症                | オルメサルタン錠・OD錠<br>テルミサルタン錠・OD錠<br>カンデサルタン錠・OD錠<br>(1歳以上の小児は、カンデサルタン錠・OD錠) |       |
| 腎実質性高血圧症            | カンデサルタン錠・OD錠                                                            |       |
| ACE阻害薬投与が適切でない慢性心不全 |                                                                         |       |

⑦降圧薬（ACE阻害薬）

| 効能・効果         | 第一選択薬         | 第二選択薬      |
|---------------|---------------|------------|
| (本態性) 高血圧症    | エナラプリルマレイン酸塩錠 | イミダプリル塩酸塩錠 |
| 腎性高血圧症        |               |            |
| 腎血管性高血圧症      |               |            |
| 悪性高血圧症        |               |            |
| 慢性心不全         |               |            |
| 糖尿病性腎症（1型糖尿病） | イミダプリル塩酸塩錠    |            |

⑧ビスホスホネート製剤内服薬

| 効能・効果 | 第一選択薬                       | 第二選択薬 |
|-------|-----------------------------|-------|
| 骨粗鬆症  | リセドロン酸N a錠17.5mg<br>(週1回投与) |       |

⑨糖尿病薬（α-グルコシダーゼ阻害薬）

| 効能・効果               | 第一選択薬       | 第二選択薬   |
|---------------------|-------------|---------|
| 糖尿病の食後過血糖の改善        | ボグリボース錠・OD錠 | ミグリトール錠 |
| 耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制 |             |         |

⑩糖尿病薬（グリニド系薬）

| 効能・効果 | 第一選択薬                    | 第二選択薬 |
|-------|--------------------------|-------|
| 2型糖尿病 | レバグリニド錠<br>ミチグリニドC a・OD錠 |       |

⑪ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬（成人高血圧症）

| 効能・効果 | 第一選択薬                  | 第二選択薬             |
|-------|------------------------|-------------------|
| 高血圧症  | アムロジピンOD錠<br>ニフェジピンCR錠 | ベニジピン錠<br>シルニジピン錠 |

⑫第2世代抗ヒスタミン内服薬（成人 アレルギー性鼻炎、蕁麻疹等皮膚疾患）フォーミュラー

| 効能・効果             | 第一選択薬                                                                                                     | 第二選択薬                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| アレルギー性鼻炎、蕁麻疹等皮膚疾患 | フェキソフェナジン塩酸塩錠OD錠<br>(特徴：眠気が弱い)<br>エビナスチン塩酸塩錠<br>(特徴：1日1回投与)<br>オロバタジン塩酸塩OD錠<br>(特徴：効果発現が早い)が1日2回朝及び就寝前投与) | ビラノアOD錠<br>(特徴：効果発現が早く、眠気が弱いが、空腹時投与) |